

# **Probabilidade e Estatística**





# Material Teórico



## Medidas de Dispersão ou Variação

### **Responsável pelo Conteúdo:**

Profa. Ms. Rosangela Maura Correia Bonici

### **Revisão Técnica:**

Prof. Esp. Leandro Magalhães Peixoto

### **Revisão Textual:**

Profa. Dra. Selma Aparecida Cesarin



# UNIDADE

## Medidas de Dispersão ou Variação



- Introdução
- Cálculo da Variância e Desvio Padrão
- Finalizando



### OBJETIVO DE APRENDIZADO

- A proposta deste estudo é trabalhar com as medidas de dispersão. Nele você irá aprender como calcular a variância e o desvio padrão de dados brutos, de dados agrupados em distribuições de frequência variável discreta e de dados agrupados em distribuições de frequência variável contínua. Aprenderá também qual o significado do desvio padrão e em quais situações práticas ele poderá ser empregado.



### ORIENTAÇÕES

Para um bom aproveitamento do Curso, leia o material teórico atentamente, antes de realizar as atividades. É importante, também, respeitar os prazos estabelecidos no Cronograma.



# Contextualização

## Entenda o que é média e desvio padrão de uma prova

O entendimento natural que grande parte dos candidatos utiliza para avaliar seus desempenhos nas provas é: “acertei mais ou menos questões do que a média?”. Claro que a premissa vigente é a de que os candidatos mais bem preparados superam, em número de acertos, a média das provas.

O resultado de uma prova, normalmente, é conhecido por meio de informações como média e desvio padrão, bem como pela distribuição de frequências do número de acertos dos candidatos, expressos em forma gráfica.

Esse gráfico, denominado histograma, mostra, no eixo dos X (abscissas), o número de questões e, no eixo dos Y, o número de candidatos que acertaram o referido número de questões.

O que significam essas informações?

Numa distribuição de frequências, há três medidas importantes: a moda, a mediana e a média. A primeira é o “pico”, isto é, o ponto no eixo das abscissas de maior frequência.

A mediana é o ponto, no eixo das abscissas, que divide as ocorrências em duas frações iguais, cada uma com 50% das frequências.


A média é o ponto, no eixo das abscissas, que faria com que o gráfico ficasse equilibrado, não inclinando nem para a esquerda nem para a direita; em suma, a média é o ponto, no eixo das abscissas, situado na vertical que passa pelo centro de gravidade da figura.

O que se deseja em uma prova do Concurso Vestibular é um histograma formando uma curva simétrica, distribuído entre 0 e 25 acertos, concentrando moda, mediana e média próximas a 15 acertos, exibindo distribuição balanceada de acertos, tanto à esquerda quanto à direita do centro de distribuição, de acordo com o gráfico apresentado na figura da página a seguir.

O Gráfico mostra uma distribuição normal rigorosamente simétrica. No centro da distribuição, coincidem média, mediana e moda. Uma curva de distribuição normal (ou Curva de Gauss) tem como característica englobar 99,73% das ocorrências no intervalo compreendido entre a média e  $\pm 3$  desvios padrão, conforme detalhado no mesmo Gráfico.

O desvio padrão de uma prova mede o grau de dispersão dos candidatos em relação à média, isto é, o quanto o conjunto de candidatos se distanciou da média, tanto além como aquém do centro de distribuição. Isso significa que os escores obtidos por 99,73% dos candidatos estarão compreendidos entre a média e  $\pm 3$  desvios padrão, ou seja, salvo raras exceções, todos os candidatos estarão neste intervalo.

## Distribuição Normal



Ao se elaborar uma prova, espera-se que o resultado da aplicação dessa prova gere uma “curva de distribuição normal”, isto é, essa prova deve gerar uma média de 15 acertos e os candidatos devem estar distribuídos simetricamente entre zero e 30 acertos (ou entre dois limites internos desse intervalo, equidistantes de 15).

A obtenção de uma distribuição simétrica com 100% das ocorrências entre 0 e 30 acertos, em uma prova de 30 questões e média de 15 acertos, pode ser possível quando se obtém um desvio padrão de 5 acertos. Nesse caso, se o histograma assumir formato semelhante ao da curva normal, todos os escores possíveis de serem obtidos pelos candidatos ficariam simetricamente contidos no intervalo entre a média e  $\pm 3$  desvios padrão, ou seja, entre 0 acertos ( $15 - (3 \times 5)$ ) e 30 acertos ( $15 + (3 \times 5)$ ).

Infelizmente, não é fácil obter uma curva de distribuição normal. O resultado obtido pelos candidatos em uma prova depende de muitos fatores, entre os quais pode ser destacada a preparação deles e o grau de dificuldade da prova. Por isso mesmo, é importante poder avaliar uma prova pelo resultado obtido na sua aplicação.


A informação da média permite verificar o grau de facilidade da prova para a população que a realizou. Quanto menor a média (abaixo de 15 acertos), menor a facilidade dos candidatos com as questões. Quanto maior a média (acima dos 15 acertos), maior a facilidade dos candidatos com as questões propostas.

Uma prova, com histograma normal, com média de 15 acertos e desvio padrão de 4 acertos significa que 99,73% dos candidatos serão encontrados entre os escores 3 e 27 acertos,  $(15 - (3 \times 4))$  e  $(15 + (3 \times 4))$ . Isso significa que os candidatos com escores 0, 1, 2, 28, 29 e 30 acertos serão 0,23% da população; portanto, pouquíssimos, conforme mostrado na figura a seguir, correspondente à distribuição com desvio 4.

Enquanto que numa prova, também com histograma normal, com média de 15 acertos, mas desvio padrão de 2 acertos, significa que 99,73% dos candidatos serão encontrados entre os escores 9 e 21 acertos,  $(15 - (3 \times 2))$  e  $(15 + (3 \times 2))$ . Isto é, também haverá poucos candidatos (0,23%) com escores de 0 até 8 e de 22 até 30 acertos, conforme mostrado na figura correspondente à distribuição com desvio 2.

Analisando as duas figuras que seguem, é possível concluir que quanto maior for o desvio padrão, mais aberta é a curva (maior dispersão), ou seja, maior variedade de escores obtidos pelos candidatos e melhores condições de discriminar a qualificação dos candidatos.

Curvas muito fechadas (pequeno desvio padrão) significam menor dispersão, ou seja, grande concentração de escores e menor variedade deles (muitos empates). Em outras palavras, se houver muitos empates, a prova poderá não avaliar devidamente a preparação dos candidatos. Ao mesmo tempo, provas muito difíceis não diferenciam escores obtidos unicamente por meio de acerto casual



Fonte: Vestibular da UFRGS 2005  
Provas Comentadas - Processo de Avaliação  
Publicado pela COPERSE - UFRGS  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
Disponível em: <http://goo.gl/ImLus2>



# Introdução

As medidas de variação ou dispersão avaliam a dispersão ou a variabilidade da sequência numérica em análise. São medidas que fornecem informações complementares à informação da média aritmética. As principais medidas de dispersão são a variância e o desvio padrão.

Usaremos as letras  $s^2$  para denotar a variância de uma amostra e  $s$  para denotar o seu desvio padrão.

## Cálculo da Variância e Desvio Padrão

Para calcular a variância e o desvio padrão, vamos analisar três casos:

- I. Quando os dados ainda não foram agrupados em tabelas de frequência, ou seja, estão na forma de dados brutos ou rol;
- II. Quando os dados estão agrupados em distribuições de frequência variável discreta; e
- III. Quando os dados estão agrupados em distribuições de frequência variável contínua.

### Dados brutos ou rol

---

Para podermos calcular a variância e o desvio padrão de dados brutos, vamos usar as fórmulas a seguir.

#### Fórmula para o Cálculo da Variância de Dados Brutos

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- $s^2$  = Variância
- $x_i$  = Cada um dos valores assumidos pela variável
- $\bar{x}$  = Média aritmética dos dados brutos
- $n$  = Total de elementos observados

#### Fórmula para o Cálculo do Desvio padrão de Dados Brutos

$$s = \sqrt{s^2}$$

- $s$  = Desvio-padrão
- $s^2$  = Variância

Vejamos um exemplo de utilização da variância e desvio padrão. Calcule a variância e o desvio padrão das notas de três turmas de estudantes.

Quadro 1: Notas de estudantes das Turmas A, B e C

Turma	Notas dos alunos								Média	Desvio padrão
A	4	5	5	6	6	7	7	8	6	1,31
B	1	2	4	6	6	9	10	10	6	3,51
C	0	6	7	7	7	7,5	7,5		6	2,69

Observe no quadro que a média e o desvio padrão das notas já estão calculados.

Vamos ver como isso foi feito.

O desvio padrão da turma A foi calculado da seguinte forma:

1º) Determinar a média aritmética das notas, pois a variância depende dela. Como são dados brutos, vamos relembrar a fórmula para o cálculo da média.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Usando as notas da turma A para fazer os cálculos, temos:

$$\bar{x} = \frac{4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 + 8}{8}$$

$$\bar{x} = \frac{48}{8} = 6$$

**Concluimos que a média aritmética das notas vale 6.**

2º) Vamos calcular a variância das notas da turma A. Para isso, vamos usar a fórmula para o cálculo da variância de dados brutos, que é:

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Vamos entender o que a fórmula está dizendo...

$\sum (x_i - \bar{x})^2$  (faça a diferença entre cada nota e a média aritmética e eleve ao quadrado; depois, some cada uma dessas diferenças).

Depois, divida o valor que encontrou pelo total de notas menos 1.

Turma	Notas dos alunos							
A	4	5	5	6	6	7	7	8

$$\begin{aligned}
 s^2 &= \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{(4 - 6)^2 + (5 - 6)^2 + (5 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (7 - 6)^2 + (7 - 6)^2 + (8 - 6)^2}{8 - 1} \\
 &= \frac{4 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 4}{7} = \frac{12}{7} \cong 1,71
 \end{aligned}$$

**Temos que a variância das notas vale 1,71.**

3º) Vamos calcular o desvio padrão das notas usando a fórmula:

$$s = \sqrt{s^2}$$

Substituindo a variância na fórmula e fazendo o cálculo, temos:

$$s = \sqrt{1,71} = 1,31$$

**Temos que o desvio padrão vale 1,31.**

Para calcular o desvio padrão das turmas B e C, procedeu-se da mesma forma.

### Considerações

Quadro 1 – Notas de estudantes das Turmas A, B e C

Turma	Notas dos alunos								Média	Desvio padrão
A	4	5	5	6	6	7	7	8	6	1,31
B	1	2	4	6	6	9	10	10	6	3,51
C	0	6	7	7	7	7,5	7,5		6	2,69

Observando o Quadro 1, podemos fazer as seguintes considerações:

- As notas que geraram média 6 nas três turmas são bastante diferentes.
- Os desvios padrão são bem diferentes. O menor está na turma A, o intermediário na turma C e o maior na turma B.
- O desvio padrão nos mostra a variabilidade dos dados em relação à média. Grosso modo, dizemos que o desvio padrão nos mostra se a média aritmética sofreu pouca ou muita influência dos valores extremos (muito grandes ou muito pequenos). Nesse caso, podemos afirmar que:
  - A turma A foi a menos influenciada por valores extremos;
  - A turma C foi medianamente influenciada por valores extremos;
  - A turma B foi a mais influenciada por valores extremos.

## Distribuição de frequência variável discreta

Para calcular a variância e o desvio padrão de uma distribuição de frequência variável discreta, vamos usar as fórmulas a seguir:

### Fórmula para o Cálculo da Variância da Distribuição de Frequência Variável Discreta

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{\sum f_i - 1}$$

- $s^2$  = Variância
- $x_i$  = Cada um dos valores assumidos pela variável
- $f_i$  = frequência absoluta
- $\bar{x}$  = Média aritmética da variável discreta
- $\sum f_i - 1$  = Soma do total de elementos observados menos 1.

### Fórmula para o cálculo do desvio padrão

#### Distribuição de frequência variável discreta

$$s = \sqrt{s^2}$$

- $s$  = Desvio-padrão
- $s^2$  = Variância

Vejamos um exemplo.

O quadro 2 representa as notas de Matemática. Calcule a variância e o desvio padrão.

Notas de Matemática ( $x_i$ )	$f_i$
2	3
3	5
4	8
5	4
Totais	20

As notas de Matemática estão agrupadas em uma distribuição de frequência variável discreta. Para calcular a variância e o desvio padrão, temos de usar as fórmulas correspondentes.

**1º Vamos calcular a variância usando a fórmula.**

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{\sum f_i - 1}$$

### Vamos entender o que ela significa

$\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$  = devemos subtrair cada nota da média aritmética. Esse resultado deve ser elevado ao quadrado. Depois, deve ser multiplicado pela respectiva frequência.

Ao final, fazer o somatório desses valores

$\sum f_i - 1$  = somar o total de notas e subtrair 1

Primeiro, devemos calcular a média aritmética.  
Para podermos depois usar a fórmula da variância.

### Lembra-se da fórmula da média aritmética ponderada?

É ela que iremos usar!

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i}$$

Vamos usar a distribuição das notas de Matemática e abrir uma coluna para podermos multiplicar  $x_i$  por  $f_i$  e calcular a média.

Notas de Matemática ( $x_i$ )	$f_i$	$x_i \cdot f_i$
2	3	2.3=6
3	5	3.5=15
4	8	4.8=32
5	4	5.5=20
Totais	20	73

Calculando a média, temos:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i} = \frac{73}{20} = 3,65$$

A média aritmética das notas de Matemática é **3,65**.

Vamos calcular agora a Variância, usando a fórmula.



Para podermos fazer  $\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$ , vamos abrir uma nova coluna na distribuição de frequência das notas de Matemática, para poder facilitar nossos cálculos.

Notas de Matemática ( $x_i$ )	$f_i$	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$
2	3	$(2 - 3,65)^2 \cdot 3 = 8,17$
3	5	$(3 - 3,65)^2 \cdot 5 = 2,11$
4	8	$(4 - 3,65)^2 \cdot 8 = 0,98$
5	4	$(5 - 3,65)^2 \cdot 4 = 7,29$
<b>Totais</b>	<b>20</b>	<b>18,55</b>

Concluimos daí que  $\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$  vale 18,55, completando a resolução.

$$\sum f_i - 1 = 20 - 1 = 19$$

Calculando, temos  $\frac{18,55}{19} = 0,98$ .

**A variância das notas de Matemática vale 0,98.**

**2º Vamos calcular o desvio padrão usando a fórmula.**

$$s = \sqrt{s^2}$$

- $s$  = Desvio-padrão
- $s^2$  = Variância

$$s = \sqrt{0,98} \Rightarrow s = 0,99 \text{ (desvio padrão)}$$

### Considerações

Podemos concluir pelos cálculos que o desvio padrão vale 0,99, o que nos demonstra uma variabilidade pequena nas notas de Matemática.

## Cálculo da variância e do desvio padrão da distribuição de frequência variável contínua

Para calcular a variância e o desvio padrão de variáveis contínuas, devemos proceder como para as variáveis discretas, tomando somente o cuidado de substituir o **xi pelos pontos médios de cada classe**, vez que a variável está agrupada com intervalos de classe.

**Fórmula para o cálculo da variância da distribuição de frequência variável contínua**

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{\sum f_i - 1}$$

- $s^2$  = Variância
- $x_i$  = Cada um dos valores assumidos pela variável
- $f_i$  = frequência absoluta
- $\bar{x}$  = Média aritmética da variável discreta
- $\sum f_i - 1$  = Soma do total de elementos observados menos 1

### Fórmula para o cálculo do desvio padrão

#### Distribuição de frequência variável contínua

$$s = \sqrt{s^2}$$

- $s$  = Desvio-padrão
- $s^2$  = Variância

Vamos ver um exemplo.

O Quadro 3 representa um banco de horas de uma pequena empresa. Calcule a variância e o desvio padrão.

Quadro 3 – Banco de horas dos empregados de uma empresa

Banco de horas (h)	$f_i$
0   - 4	1
4   - 8	3
8   - 12	5
12   - 16	1
Total	10

1º) Para calcular a variância, a primeira coisa que temos de conhecer é a média aritmética desse banco de horas; caso contrário, não há como usar a fórmula da variância.



### Importante!

Lembra-se da fórmula da média aritmética ponderada? É ela que iremos usar!

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i}$$

Na variável contínua, para podermos calcular a média, temos de fazer aparecer os  $x_i$ , **calculando o ponto médio** entre cada uma das horas. Para isso, vamos abrir uma coluna para distribuição, para colocar o ponto médio, e outra, para podermos multiplicar  $x_i$  por  $f_i$ .

Banco de horas (h)	$f_i$	$x_i$ (ponto médio)	$x_i \cdot f_i$
0   - 4	1	$\frac{0+4}{2}=2$	$2 \cdot 1=2$
4   - 8	3	$\frac{4+8}{2}=6$	$3 \cdot 6=18$
8   - 12	5	$\frac{8+12}{2}=10$	$5 \cdot 10=50$
12   - 16	1	$\frac{12+16}{2}=14$	$1 \cdot 14=14$
<b>Total</b>	<b>10</b>	-	<b>84</b>

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i} \Rightarrow \bar{X} = \frac{84}{10} = 8,4 \text{ Temos que a média do banco de horas é } 8,4 \text{ h.}$$

Agora sim, estamos em condições de calcular a variância.

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{\sum f_i - 1}$$

Vamos usar a distribuição e abrir uma coluna para podermos calcular.

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$$

Banco de horas (h)	$f_i$	$x_i$ (ponto médio)	$(x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i$
0   - 4	1	2	$(2 - 8,4)^2 \cdot 1 = 40,96$
4   - 8	3	6	$(6 - 8,4)^2 \cdot 3 = 17,28$
8   - 12	5	10	$(10 - 8,4)^2 \cdot 5 = 12,80$
12   - 16	1	14	$(14 - 8,4)^2 \cdot 1 = 31,36$
<b>Total</b>	<b>10</b>	-	<b>102,4</b>

Temos que  $\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i = 102,4$  e  $\sum f_i - 1 = 10 - 1 = 9$

$$\text{Aplicando os valores na fórmula, vem: } s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{\sum f_i - 1} \Rightarrow s^2 = \frac{102,4}{9} = 11,38$$

**Chegamos à conclusão de que a variância vale 11,38.**

**2º Agora vamos calcular o desvio padrão usando  $s = \sqrt{s^2}$**

Substituindo os valores, temos:  $s = \sqrt{11,38} = 3,37$

### Considerações

Feitos os cálculos, verificamos que a variância do banco de horas é 3,37, o que demonstra uma variabilidade média nas horas.



#### Importante!

Quanto maior o desvio padrão, maior a variação ou dispersão dos dados.  
Quanto menor o desvio padrão, menor a variação ou dispersão dos dados.

## Finalizando

Finalizamos mais uma Unidade na qual aprendemos a calcular a variância, calcular e interpretar o desvio padrão.

Como vimos, o desvio padrão fornece informações que complementam a informação da média aritmética, mostrando se a variação dos dados que geraram a média aritmética é pequena, média ou grande.

Só conseguimos identificar se um desvio padrão é pequeno ou grande se tivermos dois conjuntos que tenham médias iguais para podermos comparar seus desvios padrão.

Estou confiante e tenho certeza de que vocês conseguiram acompanhar e que estão satisfeitos por terem conseguido vencer mais esta etapa.

Agradeço a todos, continuem se esforçando sempre e até a próxima!

# Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:



## Sites

**UOL educação**

<http://educacao.uol.com.br/disciplinas/matematica>

**Infoescola**

<http://www.infoescola.com/estatistica/variancia-e-desvio-padrao>

**Site da ADVFN**

[http://wiki.advfn.com/pt/Desvio\\_Padr%C3%A3o](http://wiki.advfn.com/pt/Desvio_Padr%C3%A3o)



## Vídeos

**Vídeo sobre cálculo da média e do desvio padrão**

Descrição do vídeo.

<http://www.youtube.com/watch?v=8X9apoqlbgs>



## Referências

- CRESPO, A. A. **Estatística Fácil**. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 1994.
- DOWNING, D. **Estatística Aplicada**. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
- MORETTIN, L. G. **Estatística Básica**. 7.ed. São Paulo: Pearson, 2000.
- NEUFELD, J. L. **Estatística Aplicada à Administração Usando o Excel**. São Paulo: Pearson, 2003.
- SPIEGEL, M. R. **Estatística**. 3.ed. Coleção Schaum. São Paulo: Pearson, 1994.
- \_\_\_\_\_. **Probabilidade e Estatística**. Coleção Schaum. São Paulo: Pearson, 1977.
- SILVA, E. M. **Estatística Para os Cursos de: Economia, Administração e Ciências Contábeis**. 3.ed. São Paulo:Atlas, 1999.





**Cruzeiro do Sul Virtual**  
Educação a Distância

[www.cruzeirodosulvirtual.com.br](http://www.cruzeirodosulvirtual.com.br)

Campus Liberdade

Rua Galvão Bueno, 868

CEP 01506-000

São Paulo - SP - Brasil

Tel: (55 11) 3385-3000



**Cruzeiro do Sul**  
Educatonal